

DEPISTER LE CANCER COLO-RECTAL

Pourquoi faut-il faire mieux ?

T PONCHON

Hépatogastroentérologie, CHU Lyon

Président CRCDC AuRA

Secrétaire ANCRCDC

JNMG
2021

Journées Nationales de Médecine Générale

PARTICIPATION EN EUROPE (%age)

Taux acceptable: 45%, taux recommandé: 65%

Taux les plus faibles:

République tchèque:	21,7%
Croatie:	19,9%
France:	30,5% (généralisation 2007)

Taux le plus élevé: Pays-Bas: **73%**

**Entre les 2: Espagne 46%, Italie (Lombardie) 54,4%,
Irlande 51%, UK 59%, Slovenie 60,4%, Lituanie 46%, Hongrie 47,3%,
Serbie 62,5%**

Fréquence, pronostic

Facteurs et niveaux de risques

facteurs génétiques

facteurs alimentaires, environnementaux

les 3 niveaux de risque

modulation des niveaux de risque

Evolution de l'incidence
Rôle du dépistage en général

Organisation du dépistage en France

Evolutions du dépistage en France: la
stratégie décennale, les 3 pistes

Evolutions coloscopie

4 POINTS PARTICULIERS

Personnes à risque élevé: que faire ?

Personnes > 74 ans et < 50 ans: que faire ?

Information aux personnes

Covid ?

MERCI !