Urgences en uveite

Ophtalmopôle Cochin

Dr Amina Chahrazed DEBIEB

***Maladies relativement rares et
de causes variées (incidence
50 cas /100000 habitants/an)***

**Uvéites : 10 % des causes de
cécités légales dans les pays
riches**

**Peuvent révéler une maladie
générale**

PERSPECTIVES

Standardization of Uveitis Nomenclature for Reporting Clinical Data. Results of the First International Workshop

THE STANDARDIZATION OF UVEITIS NOMENCLATURE (SUN) WORKING GROUP

TABLE 1. The SUN* Working Group Anatomic Classification of Uveitis

Type	Primary Site of Inflammation [†]	Includes
Anterior uveitis	Anterior chamber	Iritis Iridocyclitis
Intermediate uveitis	Vitreous	Anterior cyclitis Pars planitis Posterior cyclitis Hyalitis
Posterior uveitis	Retina or choroid	Focal, multifocal, or diffuse choroiditis Chorioretinitis Retinochoroiditis Retinitis Neuroretinitis
Panuveitis	Anterior chamber, vitreous, and retina or choroid	

*SUN = Standardization of uveitis nomenclature.

[†]As determined clinically. Adapted from the International Uveitis Study Group anatomic classification in reference 1.

U. Antérieure
Iritis, cyclite antérieure

U. Intermédiaire

U. postérieure

Comment reconnaître une uvéite?

❖ **Uvéite antérieure Aigue**

❖ Douleur, hyperhémie conjonctivale
Avec Cercle périkératique, photophobie
myosis+ (synéchies++), BAV

❖ **Uvéite intermédiaire:** myodésopsies,
BAV si Œdème maculaire

❖ **Uvéite postérieure:** myodésopsies,
BAV si atteinte maculaire et/ou
papillaire

Caractère granulomateux?

**Uvéite antérieure Non
Granulomateuse**

**Uvéite antérieure
Granulomateuse**

Caractères Granulomateux de l'uveite

Uvéites Granulomateuses

- *Sarcoïdose
- *SEP
- *Ophtalmie sympathique
- *Syphilis,
- *Herpes (unilatéralite++)
- * lyme, tuberculose,
Toxoplasmose..

Uvéites non granulomateuses

- *Spondylarthropathies
- *Maladie de Behçet
- *Syphilis
- *Origine médicamenteuse (Biphosphonates, Rifabutine)

A) Interrogatoire+++

* Antécédents personnels et familiaux, infectieux et inflammatoires

* Plainte fonctionnelle:

> Ophtalmologique

*Uvéite antérieure aiguë: rougeur, douleur oculaire, BAV, photophobie...

*Uvéite postérieure : myodésopsies , BAV brutale

> Extraophtalmologique:

Signes articulaires, pulmonaires, cutanéomuqueux (aphtose buccale/génitale), signes d'imprégnation tuberculinique..etc

B) Examen clinique

Injection conjonctivale avec Cercle perikératique.

Pupille en myosis: Synéchies !

Effet tyndall, précipités rétrocornéens, foyer rétinien au fond d'œil?

Recherche de l'étiologie

~~Check-list systématique~~

Examens selon :

- Manifestations extraoculaires
- Sémiologie ophtalmologique
- Intensité de l'uvéite

Uvéite

Origine infectieuse

Systemique
Ex: Syphilis, TBK

Oculaire Seule
Toxoplasmose
Toxocarose
Herpes

Origine inflammatoire

Systemique
sarcoidose
Behçet, SPA

Oculaire Seule
Choriorétinite de
Birdshot

Pseudo-uvéite

Uvéite

Origine infectieuse

Systemique
Ex: Syphilis, TBK

Oculaire Seule
Toxoplasmose
Toxocarose
Herpes

Origine inflammatoire

Systemique
sarcoidose
Behçet, SPA

Oculaire Seule
Choriorétinite de
Birdshot

Pseudo-uvéite

**LIO, CEIO, Mélanome,
endophtalmie**

Ce qu'il faut retenir!

- **Toute uvéite impose la réalisation d'un examen clinique bilatéral complet et une analyse fine de la sémiologie.**
- **INTERET d'un interrogatoire détaillé+++**
- **BAV pas toujours synonyme de gravité!**
- **Toujours suspecter une étiologie infectieuse/ masquerade syndrome (lymphome intraoculaire)**

Bilan Minimal : VS CRP NFS Bilan rénal, hépatique, EPS, TPHA, Quantiféron, ECA +/- imagerie thoracique.... Voire cérébrale

**Pierre angulaire du traitement des uveites non infectieuses :
corticoides (topiques, locaux ou systémique)/ traitement
d'épargne cortisonique**

Traitement adapté au site de l'inflammation

**Pas de
traitement**

**Traitement
intra- ou péri-
oculaire**

**Traitement
par voie
générale dans
certains cas**

**Traitement
par voie
générale
indispensable**

Exemples :

**Uvéite
intermédiaire
idiopathique du
sujet jeune
sans œdème
maculaire**

Exemples :

**Uvéite
antérieure
compiquée par
contiguïté
d'œdème
maculaire**

**Uvéite
intermédiaire
idiopathique du
sujet jeune
avec œdème
maculaire**

Exemples :

Sarcoïdose

Exemples :

Behçet

Cas cliniques

Cas clinique 1

**Jeune Homme 24 ans
Premier épisode d'UAA
Douleur lombaire depuis
L' âge de 20 ans**

Uvéite liée à l'HLA-B27

Urgence: prévention de l'installation irréversible de synéchies

Corticoïdes locaux 60 gouttes/ jour

Mydriatiques +++

Latérobulbaire de corticoïde

Adresser au med. Interniste ou rhumatologue +++

Contrôle à 48 heures

Décroissance adaptée clinique $\pm$ Flare meter

Succes

Echec

Prise en charge précoce

Prise en charge tardive

Cas clinique 2

- Femme 38 ans, BAV progressive
Fièvre -, HIV +
- Acuité visuelle 3/10 OD

5/10 OG

Nodules de Bouchut

Cas Clinique 3

Mme Y. 26 ans

OD 3/10 OG 4/10

Panuvéite ODG

Interrogatoire : aphotose

Prise en charge ?

QUIZZ

Question 1

- Patient âgé de 20 ans ; se plaignant de rougeur et de douleur oculaire gauche.
- Notion de fessialgies cédant sous AINS
- L'examen ophtalmologique retrouve un CPK et cet aspect (image)

- A) l'aspect représente un effet Tyndall
- B) Il faut traiter par un collyre myotique
- C) il faut traiter par un collyre mydriatique
- D) le diagnostic le plus probable étant la sarcoïdose
- E) c'est une uvéite non granulomateuse

Question 1

- Patient âgé de 20 ans ; se plaignant de rougeur et de douleur oculaire gauche.
- Notion de fessialgies cédant sous AINS
- L'examen ophtalmologique retrouve un CPK et cet aspect (image)

- A) l'aspect représente un effet Tyndall
- B) Il faut traiter par un collyre myotique
- C) il faut traiter par un collyre mydriatique
- D) le diagnostic le plus probable étant la sarcoïdose
- E) c'est une uvéite non granulomateuse

Question N2

- Patient âgé de 40 ans, se présentant pour un flou visuel , douleur et photophobie de l'œil droit, l'examen clinique retrouve : Image
- A) On traite la plainte fonctionnelle par un collyre corticoïde pour soulager le patient
- B) Prescription de mydriatique type Atropine en collyre
- C) L'uveïte dans ce contexte est souvent non granulomateuse
- D) On instaure un traitement antiviral per os type Valaciclovir
- E) On prescrit un bilan biologique à la recherche de terrain immunodéprimé

Question N2

- Patient âgé de 40 ans, se présentant pour un flou visuel , douleur et photophobie de l'œil droit, l'examen clinique retrouve : Image
- A) On traite la plainte fonctionnelle par un collyre corticoïde pour soulager le patient
- B) Prescription de mydriatique type Atropine en collyre
- C) L'uveïte dans ce contexte est souvent non granulomateuse
- D) On instaure un traitement antiviral per os type valaciclovir
- E) On prescrit un bilan biologique à la recherche de terrain immunodéprimé

Question N 3

Patient âgé de 30 ans,
BAV brutale unilatérale droite,
L'examen à la lampe à fente :(A)
L'examen du Fond d'œil : (B)
L'examen général: (C)

Question N 3

- A) Il s'agit d'une maladie de Behçet
- B) Prescription de bolus de méthylprednisolone en Urgence
- C) Le fond d'œil montre des vascularites rétiniennes
- D) Il s'agit probablement d'une origine infectieuse, l'adresser aux urgences ophtalmologiques dans les plus brefs délais
- E) Prescription de corticostéroïdes Peros dans l'hypothèse d'une sarcoïdose

Question N 3

- A) Il s'agit d'une maladie de Behçet
- B) Prescription de bolus de méthylprednisolone en Urgence
- C) Le fond d'œil montre des vascularites rétiniennes
- D) Il s'agit probablement d'une origine infectieuse, l'adresser aux urgences ophtalmologiques dans les plus brefs délais
- E) Prescription de corticostéroïdes Peros dans l'hypothèse d'une sarcoïdose

**Merci de votre
attention...**

aminachahrazed.debieb@aphp.fr